

Impfkalender für Erwachsene

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-Instituts

Impfung gegen	Auffrischimpfung	Gefährdete Berufe / Personenkreise	Reiseimpfung	sonstige Bedingungen
Cholera			auf Verlangen des Ziel- oder Transitlandes	
Diphtherie (Rachenbräune)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ alle 10 Jahre; Kontaktpersonen zu Erkrankten ▪ alle 5 Jahre 	alle Personen	bei Empfehlung durch die Gesundheitsbehörden	bei fehlender oder nicht vollständiger Grundimmunisierung
FSME (Frühsommermeningoenzephalitis)	abhängig vom Impfstoff	Laborpersonal; Forstarbeiter; Personen, die in FSME-Risikogebieten Zecken ausgesetzt sind	bei Reisen in FSME-Risikogebieten	
Gelbfieber	alle 10 Jahre		<ul style="list-style-type: none"> ▪ auf Verlangen des Ziel- oder Transitlandes, ▪ bei Reisen in bekannte Risikogebiete 	
Hepatitis A (HA)	abhängig vom Impfstoff	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HA-gefährdetes Personal im Gesundheitswesen; ▪ Fernreisende (Tropen) ▪ Angestellte in Kinderheimen u.ä.; Kanal- und Klärwerksarbeiter 		
Hepatitis B (HB)	alle 10 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HB-gefährdetes Personal im Gesundheitswesen; ▪ Polizisten, Gefängnispersonal, Sozialarbeiter mit Kontakt zu Drogenabhängigen etc.; ▪ Dialysepatienten, Patienten mit häufiger Übertragung von Blut oder Blutbestandteilen (z. B. Bluter), Patienten vor ausgedehnten chirurgischen Eingriffen; ▪ HIV-Positive; ▪ Patienten in psychiatrischen Einrichtungen; ▪ Risikogruppen (Homosexuelle, Prostituierte Drogensüchtige etc.); ▪ bei Kontakt mit potenziell infektiösen Personen (HbsAg-Träger) 	bei Reisen in Risikogebiete oder falls Kontakt zu Risikogruppen besteht	
Influenza	jährlich mit einem aktuellen, von der WHO empfohlenen Impfstoff	<ul style="list-style-type: none"> ▪ medizinisches Personal; ▪ Personal in Einrichtungen mit großem Publikumsverkehr etc.; ▪ Senioren ▪ Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit erhöhter Gesundheitsgefährdung (z.B. Diabetiker, HIV-Positive etc.); ▪ Personen die ungeimpfte Risikopersonen betreuen 		

Impfung gegen	Auffrischimpfung	Gefährdete Berufe / Personenkreise	Reiseimpfung	sonstige Bedingungen
Masern und Mumps		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ungeimpfte bzw. empfängliche ▪ Personen in pädiatrischen Einrichtungen, Kinderheimen und ähnlichen Einrichtungen 		Auffrischung
Meningokokken		gefährdetes Laborpersonal; Personen mit Immundefekt	bei Reisen in Risikogebiete	
Pertussis (Keuchhusten)		Personal in pädiatrischen Einrichtungen, Kinderheimen und ähnlichen Einrichtungen		
Pneumokokken	Wiederholungsimpfung alle 6 Jahre			Senioren
Poliomyelitis (Kinderlähmung)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nur bei Reisen in Risikogebiete; ▪ nur für gefährdetes medizinisches und Laborpersonal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ alle Personen bei fehlender Grundimmunisierung; ▪ alle Kontaktpersonen eines Polio-Kranken; 		
Röteln		ungeimpfte bzw. empfängliche Personen in Einrichtungen der Pädiatrie, der Geburtshilfe, der Schwangerschaftsbetreuung, in Kinderheimen und ähnlichen Einrichtungen;		Auffrischung
Tetanus	alle 10 Jahre			alle ungeimpften Personen
Tollwut	abhängig von Impfstoff	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierärzte, Jäger, Forstpersonal u. a. Personen bei Umgang mit Tieren in Risikogebieten; ▪ gefährdetes Laborpersonal 	bei Reisen in Risikogebiete	Immunprophylaxe nach Kontakt mit tollwutverdächtigen oder tollwütigen Tieren
Typhus			bei Reisen in Risikogebiete	
Varizellen (Windpocken, Gürtelrose)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seronegatives* Personal im Gesundheitsdienst, in Kindergärten etc.; 		Grundimmunisierung Auffrischung