

# Impfkalender für Erwachsene

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-Instituts

Impfung gegen	Auffrischimpfung	Gefährdete Berufe / Personenkreise	Reiseimpfung	sonstige Bedingungen
<b>Cholera</b>			auf Verlangen des Ziel- oder Transitlandes	
<b>Diphtherie (Rachenbräune)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ alle 10 Jahre; Kontaktpersonen zu Erkrankten</li> <li>▪ alle 5 Jahre</li> </ul>	alle Personen	bei Empfehlung durch die Gesundheitsbehörden	bei fehlender oder nicht vollständiger Grundimmunisierung
<b>FSME (Frühsommermeningoenzephalitis)</b>	abhängig vom Impfstoff	Laborpersonal; Forstarbeiter; Personen, die in FSME-Risikogebieten Zecken ausgesetzt sind	bei Reisen in FSME-Risikogebieten	
<b>Gelbfieber</b>	alle 10 Jahre		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ auf Verlangen des Ziel- oder Transitlandes,</li> <li>▪ bei Reisen in bekannte Risikogebiete</li> </ul>	
<b>Hepatitis A (HA)</b>	abhängig vom Impfstoff	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HA-gefährdetes Personal im Gesundheitswesen;</li> <li>▪ Fernreisende (Tropen)</li> <li>▪ Angestellte in Kinderheimen u.ä.; Kanal- und Klärwerksarbeiter</li> </ul>		
<b>Hepatitis B (HB)</b>	alle 10 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HB-gefährdetes Personal im Gesundheitswesen;</li> <li>▪ Polizisten, Gefängnispersonal, Sozialarbeiter mit Kontakt zu Drogenabhängigen etc.;</li> <li>▪ Dialysepatienten, Patienten mit häufiger Übertragung von Blut oder Blutbestandteilen (z. B. Bluter), Patienten vor ausgedehnten chirurgischen Eingriffen;</li> <li>▪ HIV-Positive;</li> <li>▪ Patienten in psychiatrischen Einrichtungen;</li> <li>▪ Risikogruppen (Homosexuelle, Prostituierte Drogensüchtige etc.);</li> <li>▪ bei Kontakt mit potenziell infektiösen Personen (HbsAg-Träger)</li> </ul>	bei Reisen in Risikogebiete oder falls Kontakt zu Risikogruppen besteht	
<b>Influenza</b>	jährlich mit einem aktuellen, von der WHO empfohlenen Impfstoff	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ medizinisches Personal;</li> <li>▪ Personal in Einrichtungen mit großem Publikumsverkehr etc.;</li> <li>▪ Senioren</li> <li>▪ Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit erhöhter Gesundheitsgefährdung (z.B. Diabetiker, HIV-Positive etc.);</li> <li>▪ Personen die ungeimpfte Risikopersonen betreuen</li> </ul>		

<b>Impfung gegen</b>	<b>Auffrischimpfung</b>	<b>Gefährdete Berufe / Personenkreise</b>	<b>Reiseimpfung</b>	<b>sonstige Bedingungen</b>
<b>Masern und Mumps</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ungeimpfte bzw. empfängliche</li> <li>▪ Personen in pädiatrischen Einrichtungen, Kinderheimen und ähnlichen Einrichtungen</li> </ul>		Auffrischung
<b>Meningokokken</b>		gefährdetes Laborpersonal; Personen mit Immundefekt	bei Reisen in Risikogebiete	
<b>Pertussis (Keuchhusten)</b>		Personal in pädiatrischen Einrichtungen, Kinderheimen und ähnlichen Einrichtungen		
<b>Pneumokokken</b>	Wiederholungsimpfung alle 6 Jahre			Senioren
<b>Poliomyelitis (Kinderlähmung)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nur bei Reisen in Risikogebiete;</li> <li>▪ nur für gefährdetes medizinisches und Laborpersonal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ alle Personen bei fehlender Grundimmunisierung;</li> <li>▪ alle Kontaktpersonen eines Polio-Kranken;</li> </ul>		
<b>Röteln</b>		ungeimpfte bzw. empfängliche Personen in Einrichtungen der Pädiatrie, der Geburtshilfe, der Schwangerschaftsbetreuung, in Kinderheimen und ähnlichen Einrichtungen;		Auffrischung
<b>Tetanus</b>	alle 10 Jahre			alle ungeimpften Personen
<b>Tollwut</b>	abhängig von Impfstoff	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tierärzte, Jäger, Forstpersonal u. a. Personen bei Umgang mit Tieren in Risikogebieten;</li> <li>▪ gefährdetes Laborpersonal</li> </ul>	bei Reisen in Risikogebiete	Immunprophylaxe nach Kontakt mit tollwutverdächtigen oder tollwütigen Tieren
<b>Typhus</b>			bei Reisen in Risikogebiete	
<b>Varizellen (Windpocken, Gürtelrose)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seronegatives* Personal im Gesundheitsdienst, in Kindergärten etc.;</li> </ul>		Grundimmunisierung Auffrischung